

عنوان: مقایسه تاثیر ایندکشن به دو روش ضربانی و مداوم بر نتایج حاملگی در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان ۲۹ بهمن

تبریز در سال ۱۳۸۴-۸۵

نام دانشجو: وحیده فیروزان

رشته و مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد - مامایی

استاد(ان) راهنما: فهیمه صحتی

اساتید مشاور: دکتر فاطمه رنجبر- دکتر مرتضی قوجازاده

شماره پایان نامه: ۱۹۸

مقدمه فعالیت ناکافی رحم یا به عبارتی انقباضات هیپوتونیک رحم ، بعنوان یک علت شایع و قابل اصلاح پیشرفت غیر طبیعی زایمان میباشد که می توان با اکسی توسین تصحیح کرد و با اطمینان اقدام به زایمان واژینال نمود. این واقعیت که طولانی شدن بی مورد زایمان ، ممکن است در بروز عوارض و مرگ و میر دوره پری ناتال نقش داشته باشد ، استفاده از انفوزیون داخل وریدی اکسی توسین در درمان انواع مشخص انقباضات غیر موثر را باعث شده است. روش کار، در این مطالعه ۱۰۰ زن باردار مراجعه کننده به بیمارستان ۲۲ بهمن تبریز در مطالعه ای نیمه تجربی شرکت کردند. بطوریکه به صورت تصادفی در گروه ایندکشن ضربانی یا مداوم قرار گرفتند و نتایج حاملگی از نظر پیشرفت زایمان ،هیر استیمولشن ،آپگار نوزاد،هیپر بیلی روبینمی نوزاد،طول مدت لیبرو زایمان،نوع زایمان و طول مرحله سوم زایمان مورد بررسی قرار گرفته شد.ابزار جمع آوری داده ها نمودار پارتو گرام و پرسشنامه ای شامل دو بخش بود. بخش اول مربوط به مشخصات فردی اجتماعی وباروری افراد و بخش دوم شامل مشاهدات پژوهشگر هنگام نمونه گیری و نتایج بدست آمده از ایندکشن و بررسی های آزمایشگاهی بود.داده های بدست آمده از مطالع،بوسیله روشهای آماری توصیفی(درصد ها و جداول توزیع فراوانی)و آموتهای آماری مقایسه تفاوت میانگین برای گروههای مستقل (Independent samples Ttest،آزمون آماری رابطه مجذور و آزمون دقیق فیشر (Fishers exact test) و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS.15 مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

کلمات کلیدی: اکسی توسین- ایندکشن مداوم- ایندکشن ضربانی- نتایج حاملگی