

عنوان: بررسی علل مراجعه نامرتب مادران باردار جهت مراقبتهای دوران بارداری در زائوهای بستری در مراکز آموزشی درمانی وابسته به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تهران، سال ۱۳۷۶

نام دانشجو: سهیل مجیدی

رشته و مقطع تحصیلی: کارشناس ارشد مامایی (آموزش مامایی)

استاد راهنما: آذر مرادی

اساتید مشاور: صدیقه صادقی خامنه، دکتر سقراط فقیه زاده

شماره پایان نامه: ۷۲

مقدمه: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی بود که با هدف تعیین علل مراجعه نامرتب زنان باردار جهت دریافت مراقبتهای دوران بارداری در زائوهای بستری در مراکز آموزشی درمانی وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی شهر تبریز سال ۱۳۷۶ انجام گرفت.

روش کار: در این مطالعه زائوهای که ۴ بار یا کمتر جهت دریافت مراقبتهای دوران بارداری معاینه شدند یا مراقبت را تنها از سه ماهه سوم بارداری شروع کردند و در مراکز آموزشی درمانی تهران زایمان می‌کردند مورد بررسی قرار گرفتند. از مناطق مختلف شهر تهران (شمال، جنوب، مرکز، شرق، غرب) ۵ مرکز از کل ۱۴ مرکز آموزشی درمانی دارای زایشگاه به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند سپس داده‌ها به روش نمونه‌گیری آسان از ۳۷۵ زن بعد از زایمان جمع‌آوری گردید. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه‌ای شامل ۳ بخش علل فردی اجتماعی و علل ساختاری و علل شخصی شامل نگرش و آگاهی جمع‌آوری شدند.

یافته‌ها: نتایج نشان داد زائوهای با گروه سنی ۲۰ تا ۲۹ سال (۵۰/۹٪) با سن ازدواج زیر ۱۹ سال (۸۱/۰۳٪) و خانه دار (۹۷/۹٪)، بیسواد (۴۱٪) و همسران با سواد ابتدایی (۴۸/۵۳٪) همسران با شغل آزاد و کارگر به ترتیب (۵۳/۱٪ و ۳۲/۳٪)، ساکن جنوب تهران (۵۷/۱٪)، بعد خانوار ۵،۶،۷ نفره (۴۶/۷٪)، سابقه سقط و مرده‌زایی به ترتیب (۴/۱۱٪، ۴/۰۵٪) و حملگی فعلی (۰/۵٪) و نقل مکان در طول بارداری (۱۹/۲٪) و عدم دسترسی به وسیله نقلیه (۲۲/۴٪) و حملگی ناخواسته (۴۰٪)، عدم وجود درمانگاه در محل زندگی (۱۲/۸٪) و نبودن فردی جهت نگهداری فرزندان (۲۲/۶٪)، زمان اولین مراجعه اکثر (۳۶٪) افراد نمونه در سه ماهه دوم بارداری، تعداد مراجعات در سه ماهه اول و دوم بارداری در بیشتر موارد یکبار، در سه ماهه سوم ۲ بار بوده است. بیشتر افراد نمونه به مراکز دولتی (۴۷/۲٪) و اغلب از نوع مراکز بهداشتی درمانی شهر ۳۲ درصد مراجعه کردند. مهمترین گویه‌های نگرش از علل شخصی موارد زیر بود. قبلاً بچه داشتم می‌دانستم چطور باید از خودم مراقبت کنم (۵۹/۲٪)، فکر نمی‌کردم حاملگی آنقدر مهم باشد (۳۸/۴٪). در بخش آگاهی علل شخصی، زائوها در مورد دریافت اولیه و منظم مراقبتهای دوران بارداری بر کاهش میزان مرگ و میر مادر و کودک و عوارض بعد از زایمان از آگاهی کمتری برخوردار بودند. مهمترین علل ساختاری مطرح شده عبارت بودند از: بالا بودن هزینه مراقبت (۳۳/۳٪)، نداشتن بیمه پزشکی (۲۸/۸٪).

واژه‌های کلیدی: علل مراجعه نامرتب، زن باردار، زائو، مراکز آموزشی درمانی