


مقایسه اثربخشی روشهای تنظیم خانواده

چگونه می‌توان اثربخشی روش خود را بیشتر کرد

تأثیر بیشتر
کمتر از ۱ مورد حاملگی
در ۱۰۰ زن در یک سال



روشهای کاشتنی (ایمپلنتها)، IUD، عقیم‌سازی زنانه: پس از انجام پروسیجر، نیاز به هیچ اقدام یا به خاطر سپاری موردی وجود ندارد یا نیاز کمی وجود دارد.
واژکتومی: در ۳ ماه اول از روش دیگری نیز استفاده کنید.



روشهای تزریقی: تزریقهای بعدی را به موقع انجام دهید.
روش آمنوره ناشی از شیردهی (به مدت ۶ ماه): بطور مکرر در طول روز و شب شیر خود را به شیرخوار بدهید.
قرصها: روزانه یک قرص بخورید.
برچسب، حلقه واژینال: وسیله را در محل نگهداشته و به موقع آن را عوض کنید.



کاندومها، دیافراگم: در هر بار نزدیکی جنسی بطور صحیح استفاده کنید.
روشهای آگاهی از زمان باروری: در روزهای باروری از نزدیکی خودداری کنید یا از کاندوم استفاده کنید. ممکن است استفاده از روشهای جدیدتر (روش روزهای استاندارد و روش دو روزه) آسانتر باشند.



نزدیکی منقطع، اسپرم‌کشها: در هر باری که رابطه جنسی دارید بطور صحیح استفاده کنید.

تأثیر کمتر
حدود ۳۰ مورد حاملگی در
۱۰۰ زن در یک سال